

<b>Nom :</b> <b>Phalaenopsis amboinensis (J.J.Smith mars 1911)</b>	
<b>Sous famille</b> <b>Tribu</b> <b>Sous tribu</b> <b>Genre</b> <b>Espèce</b>	<i>Epidendroideae</i> <i>Vandeae</i> <i>Laeliinae</i> <i>Phalaenopsis</i> <i>Phalaenopsis. amboinensis</i>
	
<b>Détails :</b>	
<b>Pays d'origine :</b>	Archipel des Moluques, archipel des Célèbes, Sulawesi - en forêt de 0 à 600m
<b>Fleurs :</b>	Tige très courte masquée par les feuilles <b>Fleurs :</b> grandes (>5 cm), coriaces, blanc crème teintées de taches brun rougeâtre. Les sépales et les pétales sont semblables, blancs à la base et vert jaunâtre au sommet. La colonne est blanche, charnue, arquée et présente 2 petits renflements à sa base. La plante peut fleurir toute l'année mais fleurit généralement en été. Les fleurs sont très agréablement parfumées (odeur de sureau)..
<b>Températures (°C)</b>	chaudes nuit 15°-19°C / jour 19°- 30 °C
<b>Climat :</b>	Tempéré à chaud - Ombre (< 10 000 lux)
<b>Difficulté d'entretien :</b>	Assez facile. Humidité assez élevée dans son biotope naturel Arrosage : régulier toute l'année, plus abondant en été
<b>Périodes de floraison :</b>	Période de floraison : Printemps / Eté
<b>Durée de floraison :</b>	Plusieurs mois
<b>Prix ttc :</b>	<b>12 €</b>
	<b>Conseils particuliers :</b> - <i>Fertilisation</i> : pendant la croissance - <i>Période de repos</i> : Non - <i>Mode de division</i> : L'espèce produit facilement des keikis - <i>Rempotage</i> : Tous les 2 ans, de préférence à la reprise de la croissance avec mélange d'écorce + sphagnum

Octobre 2017